Gac Sanit. 2025;39(S2):210

Gaceta Sanitaria

https://www.gacetasanitaria.org

848 - ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE NO PARTICIPACIÓN EN EL CRIBADO DE CÉRVIX DEL PAÍS VASCO

D. del Valle Peña, E. Arenaza Lamo, A. Dávila Expósito, M.B. Roncero Santos, Y. Medina Vílchez, M.P. Costillas Caño, N. Cobo García, P. Reguera Lago, I. Díez Itza

Hospital Universitario Donostia; Programa de Cribado de Cáncer de Cérvix; OSI Barakaldo-Sestao; OSI Bidasoa; Instituto Onkologikoa; Universidad del País Vasco.

Resumen

Antecedentes/Objetivos: Tras conseguir una cobertura de invitación del 100% de la población elegible de Euskadi, la tasa de participación del 2023 a través del cribado poblacional fue de un 60% y los primeros meses del 2024 del 65%. Es el momento de desarrollar estrategias para aumentar la participación, pero para ello debemos saber cuáles son las causas reales que tienen las mujeres para no responder a la invitación del programa de cribado. En el estudio que presentamos vamos a analizar las causas de no participación de todas las mujeres de Euskadi que fueron invitadas a realizarse una prueba de cribado durante el mes de abril del 2024, con el objetivo principal de desarrollar estrategias que ayuden a aumentar dicha participación en el programa de cribado de cérvix de Osakidetza.

Métodos: Estudio observacional y descriptivo. Se realizará una encuesta telefónica al 100% de la población invitada y no participante del cribado de cérvix del mes de abril del 2024 para estudiar las causas de su no participación.

Resultados: Hasta el momento se han realizado 1.041 llamadas telefónicas, participando un 44,3% de las mujeres. Las principales causas de no participación han sido las siguientes: realizarse cribado en centro sanitario privado (28,4%), pereza u olvido (19,3%), incompatibilidad horaria laboral (15,8%), motivos de salud (9,3%) o ser población no elegible que se invitó por error (5,9%). Se han analizado las causas según diferentes factores sociodemográficos, detectando que en rangos de edad más

0213-9111 © 2025 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados

avanzados aparecen otras causas como el cuidado de terceras personas y en más jóvenes la de embarazo o puerperio. Cuando analizamos las causas según el nivel de formación, se observa que la causa de asistencia a centro privado aumenta con el nivel de educación, a la vez que disminuye la causa de incompatibilidad horaria.

Conclusiones/Recomendaciones: La participación en Euskadi en 2024 superaría el 70% si tenemos en cuenta la población no elegible invitada por error. Las causas más frecuentes de no participación en el cribado de cérvix sobre las que podemos actuar son la pereza u olvido, incompatibilidad horaria y razones de salud. Aunque se dan ciertas diferencias entre los rangos de edad y nivel formativo, estas no son significativas por el momento. A través de estrategias específicas desarrolladas a partir de este estudio podremos conseguir una participación muy por encima del 70% y contribuir así al objetivo final de la erradicación del cáncer de cuello de útero como problema de salud pública.

Financiación: Beca para proyectos Bottom-up del Gobierno Vasco 2024.

0213-9111 © 2025 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados