

Gaceta Sanitaria



https://www.gacetasanitaria.org

73 - BARRERAS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN ÁREAS ENDÉMICAS DE NTD EN BENÍN Y COSTA DE MARFIL: EVALUACIÓN DEL ALCANCE Y LOS FACTORES ASOCIADOS

C. Juan Jiménez, A. Gine-March, Y.B. Tossou, C.J. Johnson, P.H. Biaka, F.N. Gbaguidi, V. Bedie, S.I. Agbo, M. Nichter, et al.

Anesvad Foundation; Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le développement Durable, Université d'Abomey-Calavi.

Resumen

Antecedentes/Objetivos: La discapacidad es un problema de salud global que afecta a más de 1 billón de personas, y de esa cifra, aproximadamente 200 millones sufren discapacidades funcionales severas. Las enfermedades tropicales desatendidas (ETD), son la principal causa de discapacidad en países endémicos, y las personas que las padecen ven limitado su acceso a servicios básicos de salud y sociales. Además, las personas con discapacidad (PcD), ligada a las ETD o por otras causas, sufren restricciones en su participación social (RPS), desconociéndose la magnitud del problema. El objetivo de este estudio es investigar dicha magnitud y los factores asociados a las mismas, en dos comunidades endémicas de ETD en Benín y Costa de Marfil.

Métodos: Estudio transversal descriptivo, realizando entre 2021 y 2022, incluyendo a 841 PcD y 90 miembros de la comunidad (incluidos familiares, personal médico y personas clave). La recolección de datos se realizó a partir de observación participante, cuestionarios y entrevistas. Además, se utilizó la puntuación P de la Organización Mundial de la Salud adaptada al contexto local para evaluar la RPS. Se triangularon los datos, categorizándolos, referenciándolos y sintetizándolos por tema, hipótesis e indicador. Para identificar los factores asociados, se llevaron a cabo análisis univariante y multivariante.

Resultados: De las 841 PcD entrevistadas, el 65,9% había experimentado RPS. Su mediana de edad fue de 38 (RIQ: 22-52) años, y la proporción de hombres y mujeres fue de 1,45. Del total, el 89,2% tenía un ingreso mensual entre 0 y 50.000 FCFA, lo que equivale a 76 euros; el 43,7% estaba casado y el 64,4% era analfabeto. Solo 98 (11,7%) tenían discapacidades ligadas al padecimiento de ETD. Los factores asociados a la RPS fueron la edad (de 30 a 44 años, p = 0,026; de 45 a 59 años, p = 0,001; y de 60 a 74 años, p = 0,005); el nivel educativo secundario o universitario (p = 0,000); la profesión (comerciante/empleada del hogar, p = 0,029; agricultor, p = 0,000; y otras profesiones, p = 0,038); y desarrollar actividades generadoras de ingresos (AGI) (p = 0,023).

Conclusiones/Recomendaciones: Los resultados del estudio muestran como la mayoría de las PcD experimentan una RSP, subrayándose la necesidad de definir directrices claras, armonizadas y adaptadas a los contextos locales, para fomentar la atención inclusiva de la discapacidad cuando se

abla de ETD.	
213-9111 © 2025 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos re	servados