Gac Sanit. 2026;40(S4):650

Gaceta Sanitaria

https://www.gacetasanitaria.org

195 - SUBREGISTRO EN LA NOTIFICACIÓN DE CAUSAS EXTERNAS DE DEFUNCIÓN EN NAVARRA

I. Iniesta, I. Delfrade, S. Matarranz, S. Marquinez, R. Teijeira, M. Boilos, N. Mendoza, M. Guevara, N. Álvarez

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ISPLN; Instituto de Investigación Navarra IdisNa; Universidad Pública de Navarra; Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF.

Resumen

Antecedentes/Objetivos: Las muertes por causa externa son aquellas que se deben a factores no naturales como accidentes, caídas, suicidios, etc. Estas muertes deben ser notificadas al personal forense quienes estudiarán y declararán la causa de defunción y sus características. El objetivo es identificar la existencia de una subdeclaración de fallecimientos a profesionales de medicina forense y analizar las causas.

Métodos: Estudio descriptivo, en el que se han seleccionado las muertes por causa externa en Navarra durante el quinquenio 2019-2023. La fuente de datos ha sido el registro de mortalidad de Navarra. Tras un primer análisis de todas las causas externas, se seleccionaron aquellas que no habían sido declaradas a profesionales forenses. Se analizaron como posibles causas: notificación fuera de Pamplona, edad y sexo de la persona fallecida y literal de causa declarada en el Boletín Estadístico de Defunción (BED).

Resultados: Se registraron 1.377 defunciones con causa externa como causa básica de defunción. De las cuales el 42,9% no habían sido declaradas por el personal forense. Alrededor del 45% de la subnotificación eran defunciones ocurridas en Pamplona. Se identificaron como causas de defunción más frecuentes en el subregistro las caídas (50,1%) y los atragantamientos (32,4%). Las muertes por caídas accidentales muestran una mediana de edad superior con respecto a las judicializadas con diferencias significativas (U de Mann-Whitney p = 0,0000). El 66% de las caídas accidentales ocurridas en la Comarca de Pamplona de hombres se judicializaron frente

0213-9111 © 2026 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados

al 53% en mujeres. Puede deberse a la edad, siendo en hombres la mediana de edad más joven. En la revisión de los literales de los BED, se observa que el 97,7% no se han notificado como causa externa sino como causas secundarias como hemorragias, fracturas o infecciones. En 5 ocasiones (0,04%) se consultó con el INMLCF ante la duda de judicializar la muerte.

Conclusiones/Recomendaciones: Conocer el subregistro y qué causas son las más frecuentemente infranotificadas permiten mejorar la calidad de las declaraciones de defunciones.

0213-9111 © 2026 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados