Gac Sanit. 2026;40(S4):620

Gaceta Sanitaria

https://www.gacetasanitaria.org

927 - PRÁCTICAS NO MÉDICAS Y LETALIDAD POR ACCIDENTE OFÍDICO, CASANARE- COLOMBIA, 2013-2024

Y.A. Azuero-Vargas, O. Castañeda-Porras, L.P. Zuleta-Dueñas

Secretaría de Salud de Casanare.

Resumen

Antecedentes/Objetivos: El accidente ofídico se define como la mordedura provocada por una serpiente, constituye una emergencia médica que, sin tratamiento oportuno y adecuado, puede ocasionar complicaciones graves. Colombia muestra tasas de morbimortalidad significativas, donde persisten las prácticas no médicas. Objetivo: caracterizar epidemiológicamente la notificación de casos por accidente ofídico al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública-Sivigila, con evidencia de prácticas no médicas (PNM) durante el período 2013-2024 en Casanare.

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todos los casos con registro de alguna PNM, previa depuración de la base de datos. Variables a estudio analizadas en tiempo lugar y persona, mediante el uso de la hoja de cálculo Excel de Microsoft Office®, medidas de frecuencia, tendencia central, dispersión y razón. Cálculo de la tasa de incidencia (TI) y de mortalidad (TM) por 100.000 habitantes y de letalidad.

Resultados: El 35,1% (709/2.016) de casos registraron PNM, con una media y mediana de 59,1 (DE = ± 15,4; r = 36-95) casos; promedio 0,55 (± 1,7; r = 0-32) días en notificar el accidente. Todos los municipios notificaron casos, 579 (81,6%) del área rural, 514 (72,5%) hombres, razón de masculinidad 2,6; mediana de edad 8,6 (r = 1-20) años. PNM: torniquete 163 (22,9%), inmovilización de miembro 86 (12,3%), inmovilización del enfermo 51 (7,1%), incisión 37 (5,2%), sangría 18 (2,5%), punción 172,4%), succión mecánica 24 (3,3%), otros 313 (44,1%). TI media anual 1,4 para todos los casos y 14,0 entre aquellos con PNM; El 0,4% (9/2.016) fallecidos, de estos, el 73,3% (6/9) con registro de PNM, TM de 2,1 y 1,4 respectivamente y de letalidad de

0213-9111 © 2026 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados

0,4% y 0,9% (6/59).

Conclusiones/Recomendaciones: La. letalidad por accidente ofídico se duplica entre quienes registran prácticas no médicas. Se requiere fortalecer las acciones de información, educación y comunicación comunitaria para promover una visión más informada y consciente sobre la interacción con serpientes.

0213-9111 © 2026 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados