



## 346 - EXTENSIÓN DEL CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL A 70-74 AÑOS EN EUSKADI. DATOS ESTIMADOS Y OBSERVADOS

*I. Moratinos Moreno, D. Guede Caballero, K. López Guridi, M.I. Portillo Villares, I. Idígoras Rubio, N. López Mintegi, I. Sainz de Rozas Aparicio, L. Clemente Bermúdez, M. Jiménez Onsurbe*

*Coordinación de Programas de Cribado; Hospital Universitario Galdakao-Usansolo; Hospital Universitario Cruces; Hospital Universitario Araba.*

### Resumen

**Antecedentes/Objetivos:** El cáncer colorrectal (CCR) es el cáncer más común en España y el tercero del mundo considerando ambos sexos. La tasa de incidencia y mortalidad del CCR aumenta con la edad. En Euskadi, el Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal (PCCR) estaba dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años, hasta que en el segundo semestre de 2024 se amplió hasta los 74 años. La planificación de políticas de salud de este tipo es esencial para optimizar recursos y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Los objetivos de este estudio son estimar y determinar las tasas de participación y positividad en la prueba inmunoquímica fecal (FIT) de la población de 70 a 74 años, comparando los resultados estimados con los observados.

**Métodos:** Se diseñó un estudio retrospectivo con datos del registro del PCCR entre 2016-2024. Se realizaron estimaciones para el grupo de edad de 70 a 74 años mediante tres metodologías diferentes: estimación basada en cribado oportunista (participantes en el cribado de #1 70 años de años previos), en cribado universal (calculando tasas esperadas según modelización de los otros grupos de edad) y basada en bibliografía (utilizando datos del programa de cribado de Países Bajos, que ya incluye población de 70 a 74 años). Se calcularon las tasas de participación y tasa de positividad FIT observadas en el programa desde el aumento de cobertura. Los resultados se estratificaron por sexo.

**Resultados:** Entre 2016 y 2022 la tasa de participación en el PCCR de las personas de 50-69 años fue de 71,7%. La tasa de positividad fue 4,8%. En este periodo, las personas de #1 70 años que participaron de forma oportunista tuvieron una tasa de participación del 73,37%, con una positividad FIT del 6,52%. La estimación basada en el cribado universal estimó una tasa de participación del 78,34% para el subgrupo de edad #1 70 años, con una positividad FIT del 6,89%. La estimación basada en bibliografía estimó una tasa de participación del 77,07% en las personas #1 70 años, con una positividad FIT del 7,81%. Se observó una participación del 78,83% para el subgrupo de edad #1 70 años, con una positividad FIT del 7,38%.

**Conclusiones/Recomendaciones:** Se observó una elevada participación tras la extensión de la edad de cribado. La tasa de positividad FIT en #1 70 años pone de manifiesto la importancia de la ampliación. La estimación de la participación basada en el cribado universal se acercó más a la

observada. La positividad FIT se situó en un punto intermedio entre la estimación basada en cribado universal y la basada en bibliografía.