



71 - CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA, MICROBIOLÓGICA Y DE USO DE ANTIMICROBIANOS EN FUNDACIÓN LA LIGA

M.F. García Rodríguez, M. Marquina Rodríguez, R. Vila Candel, C.D. Aguirre Aguirre, F. Pinzón Giraldo, A.F. Castaño Montoya, J.B. Eusse Londoño, J. Pérez Santana, A.E. Escorcía Ortiz

Universidad Internacional de Valencia; Fundación La Liga Ama Salvar Vidas.

Resumen

Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades infecciosas continúan generando una carga sustancial en los sistemas de salud y su control depende de antimicrobianos eficaces, sin embargo, su uso inadecuado ha acelerado la resistencia antimicrobiana (ram), con impacto en la morbilidad y seguridad del paciente. En oncología, la exposición a antimicrobianos y el riesgo de infecciones graves hacen prioritaria una línea base para orientar la actualización e implementación un programa de optimización de antimicrobianos (proa). El objetivo es caracterizar en 2024 la distribución de diagnósticos infecciosos, el perfil microbiológico y el consumo institucional de antimicrobianos, en la Fundación La Liga Ama Salvar Vidas, como insumo para actualizar e implementar el proa.

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo con datos secundarios de 2024, se estimaron frecuencias y proporciones de diagnósticos por servicio, se elaboró un antibiograma acumulado con fenotipos prioritarios *blee* y *kpc* (betalactamasas de espectro extendido y *Klebsiella pneumoniae carbapenemasa*) y se calculó consumo por dispensación en ddd/100 camas-día (dosis diaria definida), agrupando antibióticos en categorías *access*, *watch* y *reserve* OMS (organización mundial de la salud).

Resultados: Se registraron 317 diagnósticos infecciosos, 75,7% hospitalización y 24,3% unidad de cuidados intensivos (UCI). En hospitalización predominaron infección de vías urinarias (14,6%) e infección de sitio quirúrgico (7,9%). En UCI, sepsis o choque séptico (39,0%) fue el principal diagnóstico, seguido de bacteriemia (18,2%) y neumonía (14,3%). El perfil microbiológico mostró predominio de bacilos gramnegativos en hospitalización, *Escherichia coli* estuvo presente todo el año y se observó aumento de fenotipo *blee* desde marzo, *Klebsiella pneumoniae* presentó señales recurrentes compatibles con resistencia KPC. En UCI, *K. pneumoniae* predominó y se identificó un episodio de resistencia KPC de alta magnitud en julio, además de detección de *Candida auris*. El consumo de antimicrobianos se concentró en antibióticos *watch* (hospitalización 80,5%, UCI 86,3%), los principales contribuyentes fueron piperacilina con tazobactam, meropenem y vancomicina.

Conclusiones/Recomendaciones: La base para el proa por escenario clínico prioriza: infección urinaria, sepsis y profilaxis quirúrgica. La alta participación de la categoría *watch* y los fenotipos críticos sustentan auditoría con retroalimentación focalizada y control escalonado para meropenem, piperacilina/tazobactam y vancomicina, con seguimiento mediante ddd/100 camas-día y la proporción de uso *watch* y *reserve* frente a *access*.